

# AHMA

## GULO GULO

### TUNTOMERKIT:

Näätäeläimistä kookkain. Vahvaleukainen. Ruumiin pituus 70-100 cm, lapakorkeus 35-45 cm, häntä 16-25 cm, pitkäkarvainen, paino 10-26 kg, uros naarasta suurempi. Väriltään tummanruskea, kyljissä vaaleanruskeat pitkittäisjuovat. Hajuaisti tärkeä (haaskat).

### LEVINNEISYYS:

Itä- ja Pohjois-Suomen erämaissa, lähinnä itärajan pinnassa Lapin läänissä.

### ELINYMPÄRISTÖ:

Metsä-Lapin tunturimaastoissa. Karttaa tarkoin kulttuuriseutuja. Porojen ja peurojen elinpiirit, eli jäkäläalueet. Elinympäristön rauhallisuus tärkeää, erämaat.

### ELINTAVAT:

Liikkeellä enimmäkseen aamu- ja iltahämärissä. Liikkuu pitkiä matkoja. Rauhaton kulkija. Kiima-ajan jälkeen kukin etsii itselleen asuinalueen, jossa riittävästi ruokaa. Kiipeilee puissa ja ui hyvin. Uros on moniavioinen. Vuorokausimatkat on yleensä 30-40 kilometriä.

### RAVINTO:

Kookkaimpana saaliseläimenä porot, pääravintona haaskat tärkein, etenkin talvella raadot. Kerää ruokavarastoja talven ja kevään varalle. Tehokas peto upottavassa hangessa (Ahman kantaa, poroa ei), jolloin voi tappaa varastoon useita poroja. Myös pikkunisäkkäät, sammakot, linnunmunat, syö jopa kasveja ja marjoja.

### LISÄÄNTYMINEN:


Kiima aika maaliskuulta elokuulle. Viivästynyt sikiönkehitys. Poikaset syntyvät tammi- helmikuun lopulla, tavallisesti lumipesään. Pennut itsenäistyvät 6-7 kk iässä. Poikasia tavallisesti 1-4, pentua syntyessään tunturisopulin kokoisia, 90 grammaa. Sukukypsä jo 13-14 kk iässä.

### KANNAN KEHITYS:

Ahmakanta on romahdusmaisesti vähentynyt. Lopullinen isku sille oli moottorikelkkojen ottaminen metsästyksen apuvälineeksi. 1980-luvulla kanta käsitti yksittäisiä vaeltajia, jotka olivat yhteisiä Suomelle ja naapurivaltiolle, n. 40 -50 ahmaa.

### SUOJELU:

Saa metsästä poronhoitoalueella vain erikoisluvalla. Erittäin uhanalainen. Rauhoitettu koko maassa v. 1982 metsästyslain nojalla. Ahman aiheuttamista vahingoista maksetaan poronomistajille korvaus. Ensimmäiset koeluonteiset siirtoistutukset tehty eteläisen Suomen suuriin metsiin. Ei ole niin paha peto, mikä maine sillä on. Usein ahma löytää ilveksen tappaman haaskan, josta saa syyn niskoilleen.



# WOLVERINE

## GULO GULO

### DISTINGUISHING MARKS:

The largest of the marten animals. Strong jaw. Length of the body 70-100 cm, shoulder height 35-45 cm, tail 16-25 cm. Long-haired, weight 10-26 kg, male larger than female. Fur colour dark brown, ecru vertical streaks on the flanks. Sense of smell important (carcasses).

### PREVALENCE:

In the wildernesses of Eastern and Northern Finland, mainly near the eastern frontier of Lapland.

### HABITAT:

In the forested mountain terrains of Lapland. Avoids closely inhabited regions. Lives in the territories of the reindeers, thus lichen areas. Calmness of the territory is important, wildernesses.

### LIFE STYLES:

Moves mostly long journeys in the dawn or the dusk. Restless vagabond. After mating season, each searches itself own territory, where it can find enough food. Climbs in the trees and swims well. Male is polygamous. Day trips are generally 30-40 kilometres.

### NOURISHMENT:

Reindeer is the biggest of the prey animals. Carcasses are the main nourishment, especially in the winter time. Collects food reserves for the winter and spring. Efficient predator in the deep sinking snow (carries wolverine, but no reindeer) when it can kill several reindeers to the store. Eats also little mammals, frogs, the eggs, even plants and berries.

### BREEDING:


Mating time from March to August. Delayed embryonic development. Kits are born at the end of January or February, usually to the snow nest. Cubs become independent at the age of 6-7 months. Breeds usually 1-4 kits which are as small as a Norway lemming at birth, 90 grams. Mature already in the age of 13-14 months.

### DEVELOPMENT OF THE POPULATION:

The wolverine population is reduced catastrophically. Snowmobile assisted hunting has been the final strike to the population growth. At the 1980s the whole population consisted of a few individual wanderers (40 -50 animals), which roamed both in Finland, Norway and Russia.

### PRESERVATION:

Can be hunted in the reindeers' grazing areas only with special licence. Extremely endangered. Protected by law in the whole country at 1982. Reindeer owners are paid the damage caused by wolverine as compensation. The first experimental transfer plantations are made to large forests of the southern Finland. Wolverine has a bad reputation as a brutal predator, but it is not true. Often it just finds a carcass killed by a lynx and gets the blame.



# РОСОМАХА

## GULO GULO

### Отличительные признаки:

Самая крупная из куньих. Длина туловища 70-100см., хвоста 16-25см., лопатки 35-45см. Длинношёрстная; вес 10-26кг.; самец крупнее самки. Окрас - тёмно-коричневый, в боках - светло-коричневый. Крепкий подбородок.

### Распространённость:

Необитаемая местность в восточной и северной Финляндии и прежде всего в восточной Лапландии.

### Место жизни:

В горной местности лесов Лапландии. Избегает места скопления людей. Живёт с оленями и северными (дикими) оленями в районах лишайника.

### Жизненные обычаи:

Передвигается больше в сумерках вечером, утром и ночью. Прodelывает длинные расстояния, за сутки часто 30-40 км. Тревожный ходок. После периода течки каждый ищет себе место для жилья, где достаточно пищи. Лазет по деревьям и хорошо плавает. Прячет добычу в снежных туннелях, на деревьях, в болотах... Самец-многобрачен.

### Питание:

Эффективный хищник на больших сугробах (росомаха держится на снегу, олень нет). Поэтому одна из самых больших добыч росомох - олень, но обычной едой всё же является падаль животных, мелкие млекопитающие, лягушки, птичьи яйца. Собирает еду про запас, для этого может убить сразу нескольких оленей. Также ест растительность и ягоды.

### Размножение:

Время течки март-август. Медленное развитие зародыша. Детёныши рождаются в январе, конце февраля, обычно в снежных пещерах. Они становятся самостоятельными в возрасте 6-7 месяцев. Детёнышей обычно 2-3, их вес прим. 90гр. Росомаха способна получать потомство уже в возрасте 13-14 месяцев.

### Популяция:

Количество росомох катастрофически упало особенно после того, как на неё начали охотиться на моторных санях. В 1980 г. популяция в Финляндии и соседнем государстве составляла прим. 40-50 росомох.

### Защита, охрана:

Вид - угрожающий к исчезновению. С 1982г. охота по всей стране запрещена, но в районах разведения оленей разрешена при наличии спец. разрешения. Если росомаха нападает на оленя, хозяин оленя получает возмещение за причинённый ущерб. Росомаха не такой уж и плохой хищник, какая о ней ходит слава. Часто росомаха находит падаль убитого рысью животного, а все думают, что это она убила.

