


# KANA

## ALKUPERÄ:

Kesy kana polveutuu Intian ja Sundasaarten viidakoissa luonnonvaraisena eläväästä bankiva-kanasta. Kiinassa oli kesyjä kanoja jo n. 3000 eKr.

## TUNTOMERKIT:

Lihainen päälän harja ja leuasta riippuvat heltat ominaisia. Kukon paino n. 2,5 kg ja kanan n. 2 kg. Tavallisimmat värit valkoinen ja ruskeankirjava.



## TALOUDELLINEN MERKITYS:

Kana munii n. 16 kg / v. Vain siitoskanaloissa tarvitaan kukkoa. Kanan hautomasta hedelmöittyneestä munasta kehittyy kananpoika 21 vrk:ssa. Nykyään haudonta tapahtuu suurissa haudonta- ja kuoriutumiskoneissa. Poikaset aloittavat muninnan 21 - 22 viikon ikäisinä. Tehokkaassa tuotannossa kanoja munitetaan n. 1 vuosi.

Kanan ruumiinlämpö on 41,5 astetta ja elintoiminnot vilkkaat, niistä johtuu suuri energian tarve. Päärehuna on vilja ja lisäksi annetaan valkuaispitoista rehua.

## RODUT:

Tavallisimmat rodut ovat:

Leghorn

Lohman, valkoinen

Isa Brown, ruskea


# CHICKEN

## ORIGIN:

Tame chicken descends from bankiva hen that lives in the wild in the jungles of India and Sunda Islands. There were tame chickens in China already n. 3000 eKr.

## DISTINGUISHING MARKS:

Meaty crown of the head and gills hanging from the chin characteristic. Weight of the cock is app. 2,5 kg and chicken 2 kg. The most common colours are white and brown colourful.



## ECONOMIC MEANING:

Chicken lays eggs about 16 kg/ year. Only in the breeding poultry-houses will be needed a cock. A chick will develop from a fertilized egg bathed for 21 days by the chicken. Nowadays bathing takes place in large incubation and hatching machines. Young chickens begin to lay in 21- 22 weeks of age. Chickens with efficient production are germinated for about one year.

Due to high body temperature (41,5 degrees), chicken's vital functions are active. It means that they need plenty of energy. The main nutrition is grain and furthermore is given some albumin-rich fodder.

## BREEDS:

Most common breeds are:

Leghorn

Lohman, white

Isa Brown, brown

# КУРИЦА

## Происхождение:

Происхождение домашней курицы идет из Индии, а также из джунглей Зондских островов от дикой курицы Банкива. В Китае курица была приручена уже примерно 3000 лет до н.э.

## Отличительные признаки:

Мясные гребень-кепка и своеобразный свисающий гребень на подбородке. Вес петуха примерно 2,5 кг., вес курицы около 2 кг. Окрас оперения белый и пёстро-коричневый.

## Экономическое значение:

Курица приносит примерно 16 кг. яиц в год. Наличие петуха необходимо только на куроводческой птицеферме. Из высиживаемых курицей и оплодотворённых яиц вылупляются птенцы в течении 21 дней. В настоящее время высиживание происходит в огромных специальных машинах. Птенцы уже сами начинают нести яйца в возрасте 21-22 недель. В эффективном производстве курицы несут яйца только примерно 1 год. Температура тела курицы - 41,5 , физиологические процессы в ней протекают быстро, откуда следует, что курица нуждается в огромной пищевой энергии. Главный корм - зерно, а в качестве добавок используют корм, содержащий белок.

## Виды:

Обычными видами являются: Leghorn, Lohman белые, Isa Brawn коричневые.

