

PORO

RANGIFER TARANDUS

TUNTOMERKIT:

Kesällä ruskeanharmaa, talvella harmaa, alta valkoinen. Turkki tuuhea, kankeakarvainen. Peräpeili valkea. Sorkat suuret. Molemmilla sukupuolilla sarvet, uroksilla kookkaamat. Ruumiin pituus 180-220 cm, paino 60-180 kg, urokset huomattavasti naaraita kookkaampia.

LEVINNEISYYS:

Tunturi- ja metsä-Lapissa.

ELINYMPÄRISTÖ:

Metsämaastossa, talvella erikoisesti kuivien kangasmetsien jäkäläköissä, sekä tundralla.

ELINTAVAT:

Vaihtaa elinpiiriä ravinnon saatavuuden mukaan. Sosiaalisimpia kesällä, jolloin vasalliset vaatimet elävät tuhatpäisissä tokissa. Hirvaat elävät yksin tai pienissä laumoissa. Sosiaalinen hierarkia eli arvojärjestys tärkeä.

RAVINTO:

Kesällä heinä- ja ruohokasvit, talvella pääravintona jäkälä, joka kaivetaan lumen alta.

LISÄÄNTYMINEN:


Parittelee loka- marraskuussa, kiima kestää kerrallaan vajaan vuorokauden, kantoaika n. 7 kk. Vasoja tavallisesti vain yksi. Vasat seuraavat emoaan uuden vasan syntymään asti.

KANNAN KEHITYS:

Siperiassa peuran kehitys poroksi tapahtui mahdollisesti n. 7000 vuotta sitten. Saamelaisten kehittämä laajamittainen paimentolaisporonhoito sai alkunsa myöhäiskeskiajalla ja levisi Suomen Länsi-Lappiin 1500- luvulla. Korkeimmillaan koko poronhoitoalueen poroluku oli 1970- luvulla 195 000 yli 1-v. eläintä, mutta myöhemmin sitä on jouduttu laskemaan laidunten niukkuuden vuoksi.

METSÄSTYS:

Vuosittain teurastetaan n. 40-60 000 poroa, joista lihaa kertyy n. 1,5 milj. kg.



REINDEER

RANGIFER TARANDUS

DISTINGUISHING MARKS:

In the summertime brownish grey, in winter back is grey and stomach white. Fur is bushy, wire-haired. Reindeer has a patch of white fur beneath its tail, which is called a flag. Large cloven hooves. Both sexes have horns. Length of the body 180-220 cm, weight 60-180 kg, males appreciably bigger than females.

PREVALENCE:

In the mountain area and forests of Lapland.

HABITAT:

In wooded terrain, during winter especially on dry moors that grow lichen and moss and on the treeless plain (tundra).

LIFE STYLES:

Reindeer changes its living circle according to food availability. Social animals in the summertime, when females with fawns live in the thousand headed docks. Male reindeers live alone or in small flocks. Social hierarchy is important among males.

NOURISHMENT:

In the summer grass and herbs, in winter main nourishment is lichen, which is dug under snow.

BREEDING:


Copulates in October- November, mating lasts only one day at a time. Gestation lasts about 7 months. Reindeer breeds usually only one fawn. They follow their mothers until the new fawn is born.

DEVELOPMENT OF THE POPULATION:

7000 years ago in the Siberia caribou possibly passed to reindeer. Lapps developed extensive nomadic reindeer care in the late Middle Ages and spread they way of living to the west of Lapland in the 16th century. At its highest rate, the number of the reindeer was in 1970s (195000 over 1-year-old animals), but later the amount of reindeer has been obliged to decline because of the pasture scarcity.


HUNTING:

Annually 40-60 thousand reindeer are slaughtered, from which gathers meat about 1,5 million kg.



ДОМАШНИЙ ОЛЕНЬ

Rangifer tarandus



Отличительные признаки:

Летом коричнево-серый, зимой серый, живот белый; зад тоже белый. Шерсть густая, щетинистая. Большие копыта. У самки как и у самца есть рога, но у самца они больших размеров. Длина тела 180-220 см., вес 60-180 кг., самец значительно крупнее самки.

Распространённость:

В горах и лесах Лапландии.

Место жизни:

В лесу; зимой-в сухом лесу, где растёт лишайник, а также в тундре.

Обычаи:

Меняет районы обитания в зависимости от наличия пищи. Оленьё стадо состоит из взрослого оленя и его гарема-самок с молодыми оленятами. Пока вожак в силе, никто не посмеет оспаривать его власть в гареме. Рогачи(самцы) живут поодиночке или в небольшом стаде. Иерархия и субординация имеют важное значение.

Питание:

Летом-трава и травянистые растения; зимой-основная еда лишайник, который олень откапывает из под снега.

Размножение:

Спариваются в октябре-ноябре, течка длится неполный день(1 раз в год). Срок вынашивания оленят 7 месяцев. Обычно рождается 1 оленёнок, который находится с матерью до рождения следующего оленёнка.

Популяция:

В Сибири приручение дикого оленя в домашнего произошло 7000 лет назад. Саамский кочевой образ жизни оленей начался в конце сренего века и расширился на западе Лапландии в 1950 году. В районах оленеводства самое большое число оленей было в 1970 году-195 000 особей(все старше одного года), но позже их количество уменьшилось из-за нехватки пищи.

Охота:

Каждый год убивают 40 - 60 тысяч оленей, из которых получают примерно 1,5 млн.кг. мяса.