

# SIKA

## ALKUPERÄ:

Polveutuu villisiasta, jonka kanssa se luetaan kuuluvaksi samaan lajiin. Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa sikoja pidettiin jo kivikaudella. Nykyiset lajit ovat syntyneet englantilaisen maatiaissian ja kiinalaisen sian risteytyksestä 1700-l. lopulla.

## TUNTOMERKIT:

Paksu ja kömpelörakenteinen, 4-varpaiset sorkkajalat. Iso kartiomainen pää suippenee kärsäksi, joka toimii tunto- ja tonkimiselimenä. Urossialla voimakkaat torahampaat. Ihossa harvassa kankeita karvoja. Paksu ihonalainen rasvakerros, joka tosin jalostuksen ansiosta on ohentunut.

## TALOUELLINEN


### MERKITYS:

Helppohoitoinen, kaikkiruokainen. Porsii ensimmäisen kerran vajaan vuoden ikäisenä. Kantoaika 114 vrk, porsaita tavallisesti 18 - 14, joita emakko imettää n. 5 viikkoa. Hyvä emakko porsii 2 - 2,5 kertaa vuodessa.

### RODUT:

Tavallisimmat maatiaissika ja yorkshire-rotu.

 emakko  karju -porsas



# PIG

## ORIGIN:

Descends from the wild boar, which is counted among the same species with pig. Pigs were kept as domestic animals in Europe, Asia and North-Africa already in the Stone Age. The origin of the existing species was when English traditional pork was crossbred with Chinese pig in the end of the 18th century.

## DISTINGUISHING FEATURES:

Thick and clumsy body. Cloven hooves with 4 toes. A big conical head becomes narrower to snout, which is used for digging and sensing. Male has strong tusks. There are some rigid hair in the skin. Thick subcutaneous layer of fat, which has got thinner thanks to the breeding.

## ECONOMIC MEANING:


Easy to take care of, omnivorous. Female farrows for the first time in 12-months-old. Gestation lasts for 114 days, breeds usually 10-14 pigs, which are suckled for 5 weeks. A good sow farrows 2- 2,5 times a year.

## BREEDS

The most common breeds are countryside pork and Yorkshire-breed.

Female = sow

Male = boar



# СВИНЬЯ

## Происхождение:

Происходит от кабана, вместе с которым они относятся к одной группе. В Европе, Азии и Северной Америке свиней держали уже в каменном веке. Настоящие виды свиней произошли от скрещивания английских и китайских свиней в конце 1700 года.

## Отличительные признаки:

Толстое и нескладное животное. Копыта с 4 пальцами. Большая конусная голова суживается к рылу, которое служит как орган чувства и копания. У самца крепкие клыки. На коже редкая, грубая щетина. Под кожей толстый слой жира, толщина которого уменьшилась в результате окультивации.

## Экономическое значение:

Всеядное животное, за которым легко ухаживать. Первый раз приносит поросят в возрасте до 1 года. Срок вынашивания 114 дней. Поросят обычно 18-14, их свиноматка кормит примерно 5 недель. Хорошая свиноматка приносит детёнышей 2-2,5 раза в году.

## Виды:

Обычные местные свиньи и йорксайр-порода.

