


TUNTURISOPULI

LEMMUS LEMMUS



TUNTOMERKIT:

Ruskean, mustan ja kellertävän kirjava jyrsiä. Pitkin selkää kulkee musta juova häntään asti. Vatsapuoli vaaleampi. Ruumiin pituus 70-150 mm, häntä 10-18 mm, paino 15-120 g.

LEVINNEISYYS:

Levinneisyysalue normaalivuosina vain pohjoisimmassa Lapissa. Runsaan lisääntymisen vuosina vaeltaa etelämmäs.

ELINYMPÄRISTÖ:

Suurtunturien ylärinteet lumenviipymäalueet. Vaihtaa elinympäristöä kaksi kertaa vuodessa ja voi vaeltaa myös metsää kasvavilla seuduilla.

ELINTAVAT:

Liikkeellä hämärissä ja pimeässä, mutta myös päiväsaikaan. Tekee asuinpaikoillaan käytäväverkoston, joka risteilee kasvillisuuden joukossa. Noin joka 3.-5. vuosi massaesiintyminen, johon liittyy joukkovaelluksia.

RAVINTO:

Pääravintona sammalet, heinät ja sarat.

LISÄÄNTYMINEN:


Hyvinä vuosina monta poikuetta vuodessa. Tällöin poikasia voi syntyä talvellakin. Poikueena 3-9 poikasta, jotka puolestaan voivat lisääntyä jo 4-5 viikon iässä.

KANNAN KEHITYS:

Tehokkaasta lisääntymisestä johtuen kannanvaihtelut ovat suuria. Kun sopuleita on runsaasti, Sopuleiden tyypillisiä vihollisia ovat piekanat ja tunturikihut, etelämpänä pöllöt sekä ketut ja näätäeläimet.

NORWEGIAN LEMMING

LEMMUS LEMMUS



DISTINGUISHING MARKS:

Norwegian lemming is a varied rodent; its fur is coloured with brown, black and light yellow. From back goes black stripe down to tail. Stomach is light. Length of the body 70-150 mm, tail 10-18 mm, weight 15-120 g.

PREVALENCE:

Prevalence area during the normal year only in the northernmost Lapland. Because of ample breeding wanders to more south from time to time.

HABITAT:

Top slopes of the large mountains where there is snow to far spring. Changes habitat two times a year and can wander also in forested regions.

LIFE STYLES:

Moving in the obscure and dark, but also in the daytime. Lemming digs a corridor network on its the residences, which cruises among vegetation. When their population levels become too high, about every 3rd to 5th year, lemmings undertake mass migrations to find new feeding grounds.

NOURISHMENT:

Moss as the main nourishment, grass and sedge.

BREEDING:

The lemming can produce a litter 3-9 young every month, year round even in the wintertime if the conditions are good. Females can become pregnant at 4-5 weeks of age.

DEVELOPMENT OF THE POPULATION:

Resulting from the efficient breeding, population changes are large. Lemmings' typical enemies are arctic buzzards and long-tailed skuas, in the more south owls and foxes and weasel animals.

ПЕСТРУШКА ОБЫКНОВЕННАЯ LEMMUS LEMMUS

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ:

Пёстрый коричнево-чёрно-желтоватый грызун. Вдоль спины до хвоста-чёрная полоса. Сторона живота светлее. Длина туловища 70-150мм., хвоста 10-18мм., вес 15-120гр.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ:

Живут на самом севере Лапландии. В обильный год размножения продвигаются к югу.

МЕСТО ЖИЗНИ:

На вершинах больших снежных гор. Меняет место жизни 2 раза в год и может странствовать в лесной растительной местности.

ЖИЗНЕННЫЕ ОБЫЧАИ:

Перемещается в сумерках и ночью, но также днём.

ПИТАНИЕ:

Мох, трава и осока.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В хороший год рождается много выводков, тогда детёныши могут появиться на свет также зимой. В выводке 3-9 детёнышей, которые могут размножаться уже в возрасте 4-5 недель.

ПОПУЛЯЦИИ:

Из-за эффективного размножения популяция каждый год меняется. Врагами пеструшки являются совы, лисы, куны, канюк мохноногий и длиннохвостый поморник.

